

FER INJECTABLE POUR CHEVAUX

INDICATION : Comme aide pour le traitement de la carence en fer chez les chevaux (anémie équine).

POSOLOGIE : Poulains sevrés et poulains d'un an : 5 mL par 100 kg de poids corporel. Chevaux adultes : 10 mL par 100kg de poids corporel.

MODE D'EMPLOI : Par injection intraveineuse lente directement dans la veine jugulaire, utilisant une technique aseptique.

DURÉE DU TRAITEMENT : Tel qu'indiqué par votre vétérinaire.

PRÉCAUTIONS : En cas de réaction allergique, administrer de l'épinéphrine, de la cortisone ou un antihistaminique immédiatement, selon les directives. Si les symptômes de carence ferrique persistent, consulter un vétérinaire.

ENTREPOSAGE : Garder à la température de la pièce (15-25°C). Protéger de la lumière. Ne pas réfrigérer.

Under Licence/Sous License:
Vifor (International) Inc.,
St. Gallen, Switzerland

Sterile/Stérile

DIN 00719021

Veterinary Use Only / Usage Vétérinaire Seulement

HIPPIRON 1000

IRON INJECTION / FER INJECTABLE
20 mg/mL

Active ingredient: Each mL contains:
iron (as ferric hydroxide-sucrose complex)20 mg

Ingrédient actif : Chaque mL contient :
Du fer (sous forme d'hydroxyde ferrique-complexe
de sucrose)20 mg

Net 50 mL

Imported/Distributed by/Importé/Distribué par

BIONICHE
Animal Health Canada Inc.

P.O. Box/C.P. 1570
Belleville, Ontario K8N 5J2

IRON INJECTION FOR HORSES

INDICATIONS: As an aid in the treatment of iron deficiency in horses (equine anaemia).

DOSAGE: Weaned foals and yearlings:
5 mL per 100 kg bodyweight. Adult horses:
10 mL per 100 kg bodyweight.

ADMINISTRATION: By slow intravenous injection directly into the jugular vein, using aseptic technique.

DURATION OF TREATMENT: As directed by your veterinarian.

CAUTIONS: If an allergic reaction occurs, administer epinephrine, cortisone or antihistamine immediately, as indicated. If symptoms of iron deficiency persist, consult a veterinarian.

STORAGE: Store at room temperature (15-25°C). Protect from light. Do not refrigerate.

Lot:

Exp: